

## ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОСШЕГО НОГТЯ У ДЕТЕЙ

Ашурбеков В.Т., Казиев А.А.

Медицинский центр «Здоровье», Махачкала

**Введение.** Патология ногтевого ложа I пальца — вросший ноготь — часто встречается у детей, в основном у подростков. Существует множество методов оперативного лечения.

**Цель исследования.** Выявить эффективность применяемой методики лечения вросшего ногтя I пальца стопы.

**Материалы и методы.** В медицинском центре «Здоровье» оперировано 38 детей с вросшим ногтем I пальца стопы. Возраст — 1–3 года — 3 (7,9%), 3–7 лет — 15 (39,5%), 10–17 лет — 20 (52,6%). Мальчики — 20 (52,6%), девочки — 18 (47,4%). Одностороннее поражение — 22 (57,9%), двустороннее — 16 (42,1%). У 7 (18,4%) было выявлено врастание ногтя с двух сторон.

**Результаты.** Оперативное вмешательство проводили под местной анестезией с премедикацией. У двоих детей под внутривенным наркозом. Удаляли 1/3 ногтя без повреждения матрицы и валика (конусообразно), в который врастал ноготь. Гемостаз. Швы. Повязка с бетадином. Перевязки ежедневно. Швы снимались на 7–8-е сутки. Заживление ран у 22 (57,9%) пациентов — через 2 нед., у 16 (42,1%) — через 3 нед. Дети наблюдались в течение 2 лет. Рецидива не было.

**Заключение.** Применяемая нами методика лечения вросшего ногтя I пальца стопы оказалась эффективной. Заживление раны в пределах допустимого.