

## ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ РАЗМОЗЖЕННЫХ ПОЧКАХ У ДЕТЕЙ

Соловьев А.Е.

Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, Рязань

**Цель.** Изучить тактику лечения детей с размозжением почек.

**Материалы и методы.** За 20 лет под наблюдением находились 76 детей с травмами почек в возрасте от 2 до 18 лет. У 35 из них имелась сочетанная травма. В диагностике использовали клинические, рентгенологические и инструментальные методы исследования.

**Результаты.** Консервативно лечились 49 детей, оперативно — 27. Нефрэктомия произведена у 5 детей. За 20 лет в клинике детской хирургии детям с так называемым размозжением почки производилась двух этапная органосохраняющая операция. На I этапе при сомнительной жизнеспособности почки во время люмботомии производили тщательный гемостаз и дренирование забрюшинного пространства. На II этапе (через 4–5 дней) — релюмботомию. Некротизированные ткани почки удаляли. Оставшуюся жизнеспособная паренхима ушивается, чашечно-лоханочная система дренируется. С диагнозом «размозжение» почки двух этапная органосохраняющая операция произведена у 7 детей. У всех удалось сохранить поврежденную почку. Контроль через 5–10 лет: функция оперированной почки удовлетворительная.

**Заключение.** При тяжелых повреждениях почек в трудных для диагностики случаях операцией выбора может быть двух этапная органосохраняющая операция при «размозжениях» почек у детей.