

НАБЛЮДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ВНУТРЕННИМИ МЕЖКИШЕЧНЫМИ СВИЩАМИ

Соловьев А.Е.¹, Кульчицкий О.А.¹, Притуло Л.Ф.², Олейник А.В.²,
Акмоллаев Д.С.², Джемилов И.В.²

¹ Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, Рязань

² Медицинская академия им. С.И. Георгиевского, Симферополь

Введение. У детей приобретенные внутренние межкишечные свищи возникают очень редко. Причиной их возникновения может служить острая перфорация кишечника после оперативных вмешательств, или прикрытая (недиагностируемая) язва как осложнение НЭК у глубоко недоношенных детей.

Цель исследования. Сообщить о клиническом наблюдении детей с приобретенными внутренними межкишечными свищами.

Материалы и методы. Изучена медицинская документация 3 детей с внутренними межкишечными свищами.

Результаты. Среди 3 детей с приобретенными внутренними межкишечными свищами 2 были оперированы по поводу врожденной кишечной непроходимости. После операции возникли острые язвы кишечника. У недоношенного ребенка межкишечный свищ возник на фоне НЭК, который лечился консервативно. Все дети оперированы, межкишечный свищ ликвидирован. 2 детей живы, 1 умер после операции (полиорганная недостаточность).

Интерес сообщения в редкости наблюдений приобретенных внутренних прямых межкишечных свищей у детей. В первом случае свищ между слепой и восходящей кишками возник вследствие тяжелого осложненного течения НЭК у глубоко недоношенного ребенка. Причиной внутреннего прямого межкишечного свища у второго ребенка послужила острая язва подвздошной кишки. Хотя острая перфоративная язва была вовремя диагностирована и ушита, в дальнейшем развился межкишечный свищ между петлями тонкого кишечника, на что указывает тяжелое послеоперационное течение.

Заключение. Таким образом, приобретенные внутренние межкишечные свищи у детей встречаются редко. Причиной их могут быть острая перфорация кишечника после оперативных вмешательств или прикрытая (недиагностируемая) язва как осложнение НЭК у глубоко недоношенных детей.