

ОЖОГ ЖЕЛУДКА. ПОЛНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ ПИЛОРИЧЕСКОГО ОТДЕЛА У РЕБЕНКА 1 ГОДА

Степаненко Н.С., Разумовский А.Ю.

Детская городская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова, Москва, Россия

Описание наблюдения. Ребенок 1 года в феврале 2022 г. выпил неизвестное количество паяльной кислоты. Находились на лечении в отделении токсикологии Филатовской больницы, после стабилизации состояния по требованию родителей выписаны из стационара. Спустя 1,5 мес. начали отмечаться жалобы на рвоту, срыгивания. Снижение массы тела. В июне экстренно обратились с резкой потерей веса и невозможностью кормления через рот. Постоянные рвоты. При проведении обследования выявлена послеожоговая непроходимость пилорического отдела желудка. После предоперационной подготовки проведена лапароскопическая резекция желудка по типу Бильрот I. Энтеральная нагрузка восстановлена на 4-е п/о стуки. На 10-е сутки пациент выписан с рекомендациями обследования через 1 мес.

Ключевые слова: ожог желудка; непроходимость желудка; непроходимость привратника; стеноз привратника.