

ГЕМОРРОЙ У ДЕТЕЙ

Степанова Н.М.^{1,2}, Петров Е.М.¹, Новожилов В.А.^{1,2}

¹ Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница, Иркутск

² Иркутский государственный медицинский университет

Актуальность. Геморрой является одним из наиболее распространенных проктологических заболеваний у взрослых, несущее определенные моменты психологического и социокультурного дискомфорта. На фоне роста заболеваемости истинная распространенность геморроя в детской популяции остается неизвестной.

Материал и методы. Анализ карт 19 детей за период с 2015 года по настоящее время.

Результаты и обсуждение. Гендерный состав: 3:1 в пользу мальчиков. Дети старше 14 лет — 78,9 % (15). Отягощенный наследственный анамнез по основному заболеванию — в 57,9 % (11), по иным заболеваниям вен — 42,1 % (8). Клинические проявления хронического толстокишечного стаза имели место в 73,7 % (14), длительная дефекация, посадка на горшке — 21,1 % (4). В 89,5 % (17) по данным осмотра и дополнительного обследования картина наружного геморроя: левый — 21,1 %, правый передний — 36,8 % (7), правый задний — 42,1 %, несколько одновременно — 26,3 % (5). Изъязвления геморроидального узла — 26,3 % (5), острый тромбоз узла — 73,7 % (14). Причина обращения к проктологу: боль в области ануса — 73,7 % (14), обнаружение образования в перианальной области — 52,6 % (10), кровотечение после дефекации — 26,3 % (5), анальный зуд — 21,1 % (4). Всем пациентам с целью уточнения присутствия внутреннего геморроя выполнены РРС/ФКС, УЗС ОБП с определением кровотока v.portae в воротах печени. В 100 % случаев первоначально назначался комплекс консервативных мероприятий: диета, слабительные, местная терапия ректальными суппозиториями и мазями, гигиена перианальной области. В 68,4 % успешное консервативной лечение, 36,8 % (7) выполнено хирургическое лечение в объеме операции Миллигана-Моргана с использованием технологии LigaSure. Послеоперационных осложнений не было.

Выводы. Геморрой в детском возрасте довольно редкая патология, имеющая тенденцию к росту заболеваемости. Симптомокомплекс у детей имеет свои отличительные черты. Лечебно-диагностические мероприятия должны быть определены детским колопроктологом или хирургом. Операция Миллигана-Моргана с использованием технологии LigaSure является основным способом хирургического лечения наружного геморроя у детей.